

Vücut-kitle indeksi ile *Helicobacter pylori* enfeksiyonu arasındaki ilişki: bir vaka kontrol çalışması

The relationship between body-mass index and *Helicobacter pylori* infection: a case-control study

✉ Suat Benek¹, ✉ Mehmet Zengin², ✉ Sema Zergeroğlu², ✉ Ahmet Baydar¹, ✉ Murat Sevmiş³

¹Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye

²Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

³Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Cite this article as/Bu makaleye atıf için: Benek S, Zengin M, Zergeroğlu S, Baydar A, Sevmiş M. Vücut-kitle indeksi ile *Helicobacter pylori* enfeksiyonu arasındaki ilişki: bir vaka kontrol çalışması. J Med Palliat Care 2021; 2(2): 35-39.

ÖZ

Amaç: *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) enfeksiyonu dünya genelinde oldukça yaygın olan enfeksiyonlardan biridir. *H. pylori* ile obezite arasındaki ilişki hakkında literatürde farklı görüşler vardır. Bu çalışmada vücut-kitle indeksi (VKİ) ile *H. pylori* enfeksiyonu arasındaki ilişkiyi araştırdık.

Gereç ve Yöntem: 2019 yılı içerisinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde endoskopik muayeneleri yapılan hastalar arasında kesitsel bir çalışma yapıldı. *H. pylori* enfeksiyonunun prevalansı biyopsi ile incelendi. VKİ ile *H. pylori* enfeksiyonu arasındaki ilişki analiz edildi.

Bulgular: Popülasyonumuzdaki olguların %51,8'i *H. pylori* enfeksiyonu açısından pozitif. Histopatolojik incelemede *H. pylori*-pozitif olgularda akut ve kronik inflamasyon bulguları *H. pylori*-negatif olgulara kıyasla daha fazla idi. VKİ'si yüksek olan hastalarda *H. pylori* enfeksiyonu prevalansı VKİ'si düşük olanlara göre daha fazla idi. İstatistiksel analizde VKİ ile *H. pylori* enfeksiyonu prevalansı arasında anlamlı bir ilişki olduğu görüldü ($p<0,001$) ve bu iki parametre arasında pozitif bir doğrusal korelasyon vardı ($r=0,542$). Risk faktörleri tek değişkenli olarak incelendiğinde VKİ'nin *H. pylori* enfeksiyonu açısından anlamlı bir risk faktörü olduğu tespit edildi ($p=0,008$). Çoklu analiz sonuçları ise VKİ'nin *H. pylori* enfeksiyonu açısından bağımsız bir risk faktörü olduğunu ortaya koydu (OR=1,32 (1,09-3,46), $p=0,025$).

Sonuç: Bulgularımız VKİ ile *H. pylori* enfeksiyonu arasında anlamlı bir ilişkili olduğunu ve yüksek VKİ'nin *H. pylori* enfeksiyonu açısından bağımsız bir risk faktörü olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Vücut-kitle indeksi, gastrit, *Helicobacter pylori*, histopatolojik bulgular

ABSTRACT

Objective: *Helicobacter pylori* infection is one of the most common infections worldwide. There are different opinions in the literature about the relationship between *H. pylori* and obesity. In this study, we investigated the relationship between body-mass index (BMI) and *H. pylori* infection.

Material and Method: A cross-sectional study was conducted among patients who underwent endoscopic examinations at Tekirdağ Namık Kemal University Faculty of Medicine Hospital in 2019. The prevalence of *H. pylori* infection was examined by biopsy. The relationship between BMI and *H. pylori* infection was analyzed.

Results: 51.8% of the cases in our population were positive for *H. pylori* infection. On histopathological examination, acute and chronic inflammation findings were higher in *H. pylori*-positive cases compared to *H. pylori*-negative cases. The prevalence of *H. pylori* infection was higher in patients with high BMI than those with low BMI. Statistical analysis showed a significant relationship between BMI and the prevalence of *H. pylori* infection ($p<0,001$), and there was a positive linear correlation between these two parameters ($r=0,542$). When the risk factors were examined univariable, BMI was found to be a significant risk factor for *H. pylori* infection ($p=0,008$). Multivariable analysis results revealed that BMI is an independent risk factor for *H. pylori* infection. (OR=1.32 (1.09-3.46), $p=0.025$).

Conclusion: Our results showed that there is a significant relationship between BMI and *H. pylori* infection, and high BMI is an independent risk factor for *H. pylori* infection.

Keywords: Body-mass index, gastritis, *Helicobacter pylori*, histopathological findings

Corresponding Author / Sorumlu Yazar: Mehmet Zengin, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Bölümü, Kırıkkale, Türkiye

E-mail / E-posta: mz1379@hotmail.com

Received / Geliş: 03.02.2021 **Accepted / Kabul:** 20.02.2021



GİRİŞ

Helicobacter pylori (*H. pylori*), dünya nüfusunun yaklaşık yarısını etkileyen Gram-negatif bir bakteridir (1). *H. pylori* enfeksiyonuna zemin hazırlayan faktörler kesin olarak bilinmemekle beraber sosyoekonomik durumun ters orantılı olarak önemli bir belirleyici olduğu gösterilmiştir (1,2). *H. pylori* enfeksiyonu birçok hastalık (kronik gastrit, peptik ülser, mide kanseri, mukozayla ilişkili lenfoid doku lenfoması) için risk faktörü olup (2,3) birçok hastalık üzerindeki rolü de (kardiyovasküler, nörolojik, hematolojik ve metabolik hastalıklar) araştırılmaktadır (3).

Obezite dünya genelinde en önemi sağlık sorunlarından biri olup hipertansiyon, diabetes mellitus, uyku apnesi, hipoventilasyon, kardiyovasküler hastalıklar, gastrointestinal hastalıklar ve birçok kanser türünün altında yatan etkenlerden biri olarak kabul edilmektedir (4). Son 20 yılda dünya genelinde obezite görülme sıklığı hızla artmış olup bu artış en çok zengin ülkelerde görülmüştür (5,6). Obezitenin nedenleri arasında genetik ve çevresel çok sayıda sebep sıralanmakla beraber aşırı kalori alımının ve azalan fiziksel aktivitenin merkezi bir rol oynadığı varsayılmaktadır (5,6). Obezitenin değerlendirmesinde dünya genelinde en kabul gören yöntem vücut-kitle indeksi (VKİ)'dir.

Literatürde artmış VKİ ile *H. pylori* enfeksiyonu arasında pozitif bir ilişki olduğu öne sürülmüş olup, VKİ'si artan bireylerin daha yüksek bir *H. pylori* enfeksiyonu prevalansına sahip oldukları gözlemlenmiştir (7,8). Ayrıca, VKİ'si artan bireylerde *H. pylori* enfeksiyon tedavisine cevabın daha düşük olduğu bildirilmiştir (7,8). VKİ ile *H. pylori* enfeksiyonu arasındaki bu pozitif ilişki, obezitenin karakteristik bir özelliği olan insülin direncinin *H. pylori* enfeksiyonu ile pozitif olarak ilişkili olduğu görüşünü desteklemektedir (8). Diğer taraftan, bazı çalışmalar obezite ile *H. pylori* pozitifliği arasında ters bir ilişki olduğunu ve *H. pylori*'nin ortadan kaldırılmasının VKİ'de belirgin bir artışa yol açtığını bildirmiştir (8,9).

Literatürdeki bu farklı sonuçlar *H. pylori* ile VKİ arasındaki ilişkinin ve altta yatan mekanizmaların netleştirilmesinde daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Biz burada histopatolojik parametreleri kullanarak *H. pylori* ve VKİ arasındaki ilişkiyi analiz ettik.

GEREÇ VE YÖNTEM

Etik Onay


Bu çalışma için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan onay alınmıştır (Tarih: 13.04.2021, Karar No: 2021.89.04.07). Çalışmamız sırasındaki tüm uygulamalarda 1964 Helsinki Bildirgesi'nin ve ulusal/kurumsal bilimsel araştırma komitelerinin etik standartlarına uygun hareket edildi.

Verilerin Toplanması

Çalışmamız Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda gerçekleştirildi. Hastanemizde 2019 yılı içerisinde *H. pylori* için endoskopik biyopsi yapılan tüm hastalar (n=1600) çalışmaya dahil edildi. Olgulara ait klinik ve histopatolojik bilgiler arşiv kayıtlarından not edildi. Değerlendirmeye alınan parametreler şunlardı: yaş, cinsiyet, kilo, VKİ, alkol öyküsü, sigara öyküsü, ilaç öyküsü, *H. pylori* varlığı, intestinal metaplazi varlığı, atrofi varlığı, akut ve kronik inflamasyon varlığı. VKİ <18 olan olgular grup 1 (zayıf), VKİ'si 18-24,9 arasında olanlar grup 2 (normal), VKİ'si 25-29,9 arasında olanlar grup 3 (fazla kilolu), VKİ >30 olan olgular ise grup 4 (obez) olarak ele alındı.

Histopatoloji

Fakültemizde biyopsi örneklerinin değerlendirilmesi geleneksel ışık mikroskopu (Nikon Eclipse E600, Nikon AG Instruments, İsviçre) kullanılarak deneyimli patologlar tarafından yapılmaktadır. Gastrit parametreleri tanımlanırken genel olarak hasta başına bir adet hematoksilen-eozin lamı ve bir adet Giemsa lamı olmak üzere toplam iki adet lam kesilir ve bu lamlar üzerinden yukarıda bahsedilen beş histopatolojik parametre değerlendirilir. Bu parametreler kalitatif ve subjektif olarak hafif, orta ve ağır olmak üzere üç gruba ayrılır (Şekil 1).



Şekil 1. Gastrit parametreleri açısından akut inflamasyon, kronik inflamasyon, intestinal metaplazi ve atrofi varlığı değerlendirildi. A-B: Grup 1'de genel olarak midede gastrit parametreleri (A:H&E, x10) ve *H. pylori* (B: Giemsa, x40) izlenmedi. C-D: Grup 2'de genel olarak hafif şiddette gastrit parametreleri (C:H&E, x10) ve *H. pylori* (D: Giemsa, x40) mevcuttu (oklar). E-F: Grup 3'de genel olarak orta şiddette gastrit parametreleri (E:H&E, x10) ve *H. pylori* (F: Giemsa, x40) mevcuttu (oklar). G-H: Grup 4'de genel olarak ağır şiddette gastrit parametreleri (G:H&E, x10) ve *H. pylori* (H: Giemsa, x40) mevcuttu (oklar).

İstatistiksel Analiz

İstatistiksel analiz için SPSS version 20.0 yazılımı (SPSS Inc., Chicago, ABD) kullanıldı. Tanımlayıcı veriler not edilirken medyan (min-maks), frekans ve yüzde tercih edildi. Kategorik değişkenleri karşılaştırmak için Ki-kare testi kullanıldı ve p<0,05 olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Tek değişkenli ve çok değişkenli risk incelemesi, referans olarak %95 güven aralığı ve 1,0 risk oranı (OR) olmak üzere lojistik regresyon analizi ile değerlendirildi.

BULGULAR

Genel Özellikler

Olguların 990 (%61,8)'i erkek, 610 (%38,2)'u kadındı. Vakaların ortalama yaşı 37 (16-88), ortalama boyu 167,9 (150-195) cm, ortalama kilosu 67,5 (44-117) kg, ortalama VKİ'si 22,9 (14,0-37,3) idi. VKİ'nin yüksek olduğu olgular daha çok erkek (%75,4) ve 40 yaşın üzerindeki (%68,7) hastalar idi. VKİ açısından vakaları 80 (%0,05)'inin grup 1; 910 (%56,8)'unun grup 2, 350 (%21,8)'sinin grup 3, 260 (%16,2)'inin ise grup 4 olduğu tespit edildi. VKİ'nin yüksek olduğu olgularda dispepsi şikayetleri (%74,3), kronik aktif gastrit bulgusu (%70,8), *H. pylori* enfeksiyonu (%72,5) ile akut inflamasyon (%73,6) ve kronik inflamasyon (%68,4) bu bulguları daha yüksek oranda mevcut idi. Olguların 830 (%51,8)'u *H. pylori* açısından pozitif idi. Vakaların 540 (%33,7)'inde sigara, 70 (%0,04)'inde alkol kullanımı hikayesi mevcut idi.

VKİ ve *H. pylori* Enfeksiyonu Arasındaki İlişki

H. pylori-pozitif katılımcılar (20,3), *H. pylori*-negatif katılımcılara kıyasla daha yüksek (24,7) bir VKİ'ye sahipti. Tüm katılımcılar VKİ'lerine göre yukarıda izah edildiği gibi zayıf, normal, fazla kilolu ve obez olmak üzere dört gruba ayrıldı. Bu gruplar arasında *H. pylori* enfeksiyonunun prevalansı incelendiğinde zayıf (%37,3) ile normal (%43,6) olgulara kıyasla yaygınlık, fazla kilolu olgularda daha yüksek (%45,8)'ti ve obez olgularda yaygınlık en yüksek (%50,7) seviyeye ulaşıyordu. *H. pylori* ile mevcut parametreler arasındaki ilişki istatistiksel incelendiğinde *H. pylori* enfeksiyonunun VKİ ($p<0.001$) ile anlamlı olarak ilişkili olduğu görüldü (Tablo 1). Ayrıca *H. pylori* pozitifliği ile yüksek VKİ arasında pozitif bir doğrusal korelasyon mevcut idi ($r=0,542$) (Tablo 2).

Tablo 1. *H. pylori* ile klinikopatolojik parametreler arasındaki ilişki

		<i>H. pylori</i> pozitif (%)	<i>H. pylori</i> negatif (%)	p değeri
Yaş	> 37	477 (57,4)	454 (58,9)	0,545
	≤37	353 (42,6)	316 (41,1)	
Cinsiyet	Kadın	332 (40,0)	278 (36,1)	0,108
	Erkek	498 (60,0)	492 (63,9)	
Kilo	> 67	492 (59,2)	439 (57,0)	0,358
	≤67	338 (40,8)	331 (43,0)	
Vücut-kitle indeksi	1-2	553 (66,6)	437 (56,7)	<0,001
	3-4	277 (33,4)	333 (43,3)	
Alkol	Yok	798 (96,1)	732 (95,0)	0,291
	Var	32 (3,9)	38 (5,0)	
Sigara	Yok	543 (65,4)	517 (67,1)	0,466
	Var	287 (34,6)	253 (32,9)	
İlaç	Yok	735 (88,5)	665 (86,3)	0,185
	Var	95 (11,5)	105 (13,7)	
İntestinal metaplazi varlığı	Yok	764 (92,0)	719 (93,3)	0,307
	Var	66 (8,0)	51 (6,7)	
Atrofi varlığı	Yok	776 (93,4)	728 (94,5)	0,376
	Var	54 (6,6)	42 (5,5)	
Akut inflamasyon varlığı	Yok	565 (68,0)	434 (56,3)	<0,001
	Var	265 (32,0)	336 (43,7)	
Kronik inflamasyon varlığı	Yok	549 (66,1)	425 (55,1)	<0,001
	Var	281 (33,9)	345 (44,9)	

Anlamlılık sınırı $p<0,05$ olarak kabul edildi. Çalışmadaki önemli sonuçlar italik olarak not edildi.

Tablo 2. *H. pylori* ile klinikopatolojik parametreler arasındaki korelasyon

	Korelasyon (%95 CI) <i>H. pylori</i>	p value
Vücut-kitle indeksi	$r=0,542$ (0,375-0,732)	$p<0,001$
Akut inflamasyon varlığı	$r=0,452$ (0,351-0,691)	$p<0,001$
Kronik inflamasyon varlığı	$r=0,416$ (0,338-0,656)	$p<0,001$

Anlamlılık sınırı $p<0,05$ olarak kabul edildi. Kısaltmalar: CI: Confidence interval

H. pylori Enfeksiyonu İçin Risk Faktörü Analizi

Tek değişkenli analiz *H. pylori* enfeksiyonunun VKİ ($p=0,008$), akut inflamasyon ($p=0,015$) ve kronik inflamasyon ($p=0,028$) olmak üzere üç parametre ile anlamlı olarak ilişkili olduğunu gösterdi. Çok değişkenli analiz yapıldığında VKİ ve *H. pylori* enfeksiyonu için bağımsız bir risk faktörü olduğu tespit edildi (OR=1,32 (1,09-3,46), $p=0,025$). Tespit edilen diğer bağımsız risk faktörü ise akut inflamasyon varlığı idi (Tablo 3).

Tablo 3. *H. pylori* için risk analizi

	Univariable analizi	Multivariable analizi	
	P değeri	OR (95% CI)	P değeri
Vücut-kitle indeksi	0,008	1,32 (1,09-3,46)	0,025
Akut inflamasyon varlığı	0,015	1,43 (1,12-4,27)	0,043
Kronik inflamasyon varlığı	0,028	2,53 (0,95-4,71)	0,084

Anlamlılık sınırı $p<0,05$ olarak kabul edildi. Çalışmadaki önemli sonuçlar italik olarak not edildi. Kısaltmalar: OR: Odds ratio, CI: Confidence interval

TARTIŞMA

Bu çalışmada VKİ ile *H. pylori* enfeksiyonu arasındaki ilişkiyi inceledik ve *H. pylori* enfeksiyonu için VKİ'nin bağımsız bir risk faktörü olduğunu gördük. Ayrıca *H. pylori* enfeksiyonu akut ve kronik inflamasyonla da anlamlı olarak ilişkili idi.

H. pylori enfeksiyonu, hem mide hem de mide dışı hastalıklara neden olabilen dünya genelinde en yaygın kronik enfeksiyondur (1). Ülkeler arasında prevalansı değişmekte olan *H. pylori* enfeksiyonu, kronik gastrit, peptik ülser, MALT lenfoma gibi hastalıkların ana etkeni olduğu gibi, kardiyovasküler hastalık, diyabet ve non-alkolik hepatit gibi hastalıklar ile de ilişkili olduğu bildirilmektedir (1-3). *H. pylori*'nin mide asidinden etkilenmeden geçebilmesi üreaz aktivitesinin bir sonucudur. Bu etki şu şekilde özetlenebilir. Bakteri üreyi hidrolize ederken amonyak ve karbondioksit oluşturur (10). Amonyak H_2O ile birleşip amonyuma dönüşürken çevresini alkalileştirir ve bu durum bakteriyi mide asidinin zararlı etkisinden korur (10,11). Daha sonra bakteri salgıladığı çeşitli enzimler sayesinde mukusu parçalayarak epitel yüzeyinde hasar yapar (11). Ayrıca epitel hücrelerinin arasında kolonize olur ve mide mukozasına invaze olmadan inflamasyon yapar (11,12).

Ek olarak bakteri trombosit aktive edici faktör (PAF) salgılar, mukozaya nötrofil ve monosit toplanmasını sağlar (12). Ve sonuçta kronik aktif gastrit tablosu meydana gelir. Çalışmamızda da *H. pylori* enfeksiyonu olan olgularda kronik aktif gastrit bulgusu belirgin olarak yüksek izlenmiştir.

H. pylori ile enfekte kişilerde aynı semptom ve hastalık görülmeyebilir. Bir kısım olgularda asemptomatik gastrit görülürken, bir kısmında ise duodenal ve gastrik ülser veya MALT lenfoma gibi ciddi hastalıklar görülebilir (13,14). Örneğin bazı hatsaklarda *H. pylori* enfeksiyonu mide mukozasında kronik enflamasyona bağlı mide glandüler hücrelerinin kaybı ile sonuçlanan kronik atrofik gastrite sebep olarak mide kanseri için önemli bir risk faktörü oluşturur (14,15). Ayrıca bakterinin virulan suşları (cagA ve vacA pozitif) ile ülser, atrofik gastrit ve mide kanseri arasındaki anlamlı bir ilişki mevcuttur (15). *H. pylori* genotipleri ile ilgili araştırma çalışmamızın kapsamı dışında olmakla beraber bu konudaki ileri çalışmaların artmasıyla enfekte kişilerin hangi hastalık riski ile karşı karşıya olduğunun daha da iyi anlaşılacağını düşünmekteyiz.

Literatürde VKİ ile *H. pylori* enfeksiyonu arasındaki ilişki tartışmalıdır. Bazı çalışmalar *H. pylori* enfeksiyonunun obez hastalarda daha yaygın olma eğiliminde olduğunu ve fazla kilolu bireylerde *H. pylori* enfeksiyonunun önemli ölçüde daha düşük eradikasyon eğilimi gösterdiğini bildirmektedir (16-18). Diğer çalışmalarda ise obezite ile *H. pylori* enfeksiyonunun ters orantılı olduğunu ve *H. pylori*'nin ortadan kaldırılmasının belirgin bir VKİ artışına yol açabileceğini tarif etmektedir (19,20). Artmış VKİ'nin, immün sistem üzerindeki etkileri birçok çalışmada araştırılmış olup birçok çalışmada morbid obez hastalarda polimorfonükleer hücrelerdeki bakterisidal kapasitenin ve monositlerin makrofajlara olgunlaşmasının azaldığı gösterilmiştir (21-23). Örneğin Moulin ve ark. (22) aynı yaş ve cinsiyetteki sağlıklı bireylere kıyasla şiddetli obez hastalarda inflamatuvar hücrelerdeki öldürücü hücre aktivitede önemli bir azalma olduğunu bildirmiştir. Obez bireylerde gözlenen bu bağışıklık değişiklikleri, *H. pylori* enfeksiyonu için daha elverişli bir bağışıklık ortamı oluşturabilir. Nitekim Perdichizzi ve ark. (24) *H. pylori* enfeksiyonunun hiperglisemik obez kişilerde artma eğiliminde olduğunu göstermiştir.

Bazı çalışmalarda ise *H. pylori*'nin eradike edilmesinin gastrik leptin ekspresyonunu azalttığı ve bu azalmanın VKİ'de bir artışa sebep olduğu bildirilmiştir (27-29). Örneğin Osawa ve ark. (27) *H. pylori* eradikasyonundan sonra mide dokusunda iştahla ilgili hormon olan grelin konsantrasyonunun önemli ölçüde arttığını göstermiştir. Furuta ve ark. (28) ise *H. pylori* tedavisi gören hastaların kilo aldığını belgelemiştir. Ayrıca literatürde, *H. pylori*

enfeksiyonun bazı interlökinleri ve proinflamatuvar sitokinlerin (örneğin, TNF α) aşırı salınımını uyardığı, bu mediatörlerin salınımının kronik insülin direncinin ve lipid dismetabolizmasının daha da kötüleşmesine yol açtığı ve bu durumun da obezitenin ortaya çıkmasına katkı sağladığı bildirilmiştir (25,26).

Üstelik literatürdeki bazı çalışmalar vücut ağırlığı ile *H. pylori* prevalansında herhangi bir ilişki olmadığını bildirmiştir. Örneğin Kawano ve ark. (30) yaptığı çalışmada asemptomatik kişilerde *H. pylori* enfeksiyonu ile VKİ arasında herhangi bir ilişkili bulamamıştır. Dahası Blaser ve ark. (31) çalışmalarında *H. pylori*'nin neden olduğu mide enflamasyonunun grelin gibi birtakım bağırsak hormonlarının daha az salgılanmasına sebep olduğunu, ve bu nedenle erken çocukluk döneminde *H. pylori*'ye maruz kalan bireylerde iştah ve yiyecek alımında azalma olduğunu tespit etmişlerdir.

Literatürde görülen bu birbirinden farklı sonuçların sebebi olarak kullanılan yöntemlerin farklılığı, araştırma yapılan popülasyonların çeşitliliği ve çalışmaya dahil edilen hasta sayısı gibi faktörler sıralanabilir. Çalışmamızda daha yüksek VKİ'li bireylerin *H. pylori* enfeksiyonu açısından pozitif olma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdik. Sonuçlarımıza göre yüksek VKİ *H. pylori* enfeksiyonu için zemin hazırlayan bir faktördür. Ancak literatürde birbiriyle çelişen birçok çalışma mevcut olması nedeniyle bu bulgunun daha geniş çalışmalar ile desteklenmesi gerekmektedir.

Çalışmamızın kısıtlılıkları arasında katılımcı sayısının düşük olması, sağlıklı gönüllülerden oluşan bir kontrol grubunun olmaması, *H. pylori* genotiplerinin çalışılmaması, metabolik belirteç seviyelerinin tespit edilmemesi sayılabilir.

SONUÇ

Çalışmamız, VKİ'nin *H. pylori* enfeksiyonu ile anlamlı olarak ilişkili olduğunu ve VKİ'nin artışının *H. pylori* enfeksiyonu için bağımsız bir riski faktörü olduğunu göstermekte olup bu ilişkinin altında yatan mekanizmaların daha net olarak açıklığa çıkarılması, hastalığın tedavisi ve önlenmesinde daha başarılı yöntemlere ışık tutabilir.

ETİK BEYANLAR

Etik Kurul Onayı: Bu çalışma için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan onay alınmıştır (Tarih: 13.04.2021, Karar No: 2021.89.04.07).

Aydınlatılmış Onam: Çalışma retrospektif olarak dizayn edildiği için hastalardan aydınlatılmış onam alınmamıştır.

Hakem Değerlendirme Süreci: Harici çift kör hakem değerlendirmesi.

Çıkar Çatışması Durumu: Yazarlar bu çalışmada herhangi bir çıkara dayalı ilişki olmadığını beyan etmişlerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu çalışmada finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.

Yazar Katkıları: Yazarların tümü; makalenin tasarımına, yürütülmesine, analizine katıldığını ve son sürümünü onayladıklarını beyan etmişlerdir.

KAYNAKLAR

- Lorenzo I, Fernández-de-Larrea N, Michel A, et al. *Helicobacter pylori* seroprevalence in Spain: influence of adult and childhood sociodemographic factors. *Eur J Cancer Prev* 2019; 28: 294-303
- Krueger WS, Hilborn ED, Converse RR, Wade TJ. Environmental risk factors associated with *Helicobacter pylori* seroprevalence in the United States: a cross-sectional analysis of NHANES data. *Epidemiol Infect* 2015; 143: 2520-31.
- Kaplan M, Tanoglu A, Duzenli T, et al. *Helicobacter pylori* treatment in Turkey: Current status and rational treatment options. *North Clin Istanb* 2019; 7: 87-94.
- Caballero B. Humans against Obesity: Who Will Win? *Adv Nutr* 2019; 10: 4-9.
- Albuquerque D, Nóbrega C, Manco L, et al. The contribution of genetics and environment to obesity. *Br Med Bull* 2017; 123: 159-73.
- Zhang Y, Du T, Chen X, et al. Association between *Helicobacter pylori* infection and overweight or obesity in a Chinese population. *J Infect Dev Ctries* 2015; 9: 945-3.
- Siddiqui B, Yakoob J, Abbas Z, et al. Distribution of *Helicobacter pylori* infection and abnormal body- mass index (BMI) in a developing country. *J Infect Dev Ctries* 2018; 12: 342-6.
- Suki M, Leibovici Weissman Y, Boltin D, et al. *Helicobacter pylori* infection is positively associated with an increased BMI, irrespective of socioeconomic status and other confounders: a cohort study. *Eur J Gastroenterol Hepatol* 2018; 30: 143-8.
- Hamada M, Nomura R, Ogaya Y, et al. Potential involvement of *Helicobacter pylori* from oral specimens in overweight body-mass index. *Sci Rep* 2019; 9: 4845.
- Kamboj AK, Cotter TG, Oxentenko AS. *Helicobacter pylori*: the past, present, and future in management. *Mayo Clin Proc* 2017; 92: 599-604.
- Mentis A, Lehours P, Mégraud F. Epidemiology and diagnosis of *Helicobacter pylori* infection. *Helicobacter* 2015; 20: 1-7.
- Eusebi LH, Zagari RM, Bazzoli F. Epidemiology of *Helicobacter pylori* infection. *Helicobacter* 2014; 19: 1-5
- Mitchell H, Katelaris P. Epidemiology, clinical impacts and current clinical management of *Helicobacter pylori* infection. *Med J Aust* 2016; 204: 376-80.
- Peng C, Li NS, Hu Y, Lu NH. Impact factors that modulate gastric cancer risk in *Helicobacter pylori*-infected rodent models. *Helicobacter* 2019; 24: e12580.
- Munoz-Ramirez ZY, Mendez-Tenorio A, Kato I, et al. Whole genome sequence and phylogenetic analysis show *Helicobacter pylori* strains from Latin America have followed a unique evolution pathway. *Front Cell Infect Microbiol* 2017; 7: 50.
- Polyzos SA, Kountouras J, Zavos C, et al. The association between *Helicobacter pylori* infection and insulin resistance: a systematic review. *Helicobacter* 2011; 16: 79-88.
- Renshaw AA, Rabaza JR, Gonzalez AM, et al. *Helicobacter pylori* infection in patients undergoing gastric bypass surgery for morbid obesity. *Obes Surg* 2001; 11: 281-3.
- Arslan E, Atilgan H, Yavasoglu I. The prevalence of *Helicobacter pylori* in obese subjects. *Eur J Intern Med* 2009; 20: 695-7.
- Lane JA, Murray LJ, Harvey IM, et al. Randomised clinical trial: *Helicobacter pylori* eradication is associated with a significantly increased body mass index in a placebo-controlled study. *Aliment Pharmacol Ther* 2011; 33: 922-9.
- Yang YJ, Sheu BS, Chang WL, et al. Increased body mass index after *H. pylori* eradication for duodenal ulcer predisposes to erosive reflux esophagitis. *J Clin Gastroenterol* 2009; 43: 705-10.
- Marti A, Marcos A, Martinez JA. Obesity and immune function relationships. *Obes Rev* 2001; 2: 131-40.
- Moulin CM, Marguti I, Peron JP, et al. Impact of adiposity on immunological parameters. *Arq Bras Endocrinol Metabol* 2009; 53: 183-9.
- Krishnan EC, Trost L, Aarons S, et al. Study of function and maturation of monocytes in morbidly obese individuals. *J Surg Res* 1982; 33: 89-97.
- Perdichizzi G, Bottari M, Pallio S, et al. Gastric infection by *Helicobacter pylori* and antral gastritis in hyperglycemic obese and in diabetic subjects. *New Microbiol* 1996; 19: 149-54.
- Glass CK, Olefsky JM. Inflammation and lipid signaling in the etiology of insulin resistance. *Cell Metab* 2012; 15: 635-45.
- Basso D, Plebani M, Kusters JG. Pathogenesis of *Helicobacter pylori* infection. *Helicobacter* 2010; 15: 14-20.
- Osawa H, Nakazato M, Date Y, et al. Impaired production of gastric ghrelin in chronic gastritis associated with *Helicobacter pylori*. *J Clin Endocrinol Metab* 2005; 90: 10-6.
- Furuta T, Shirai N, Xiao F, et al. Effect of *Helicobacter pylori* infection and its eradication on nutrition. *Aliment Pharmacol Ther* 2002; 16799-806.
- Roper J, Francois F, Shue PL, et al. Leptin and ghrelin in relation to *Helicobacter pylori* status in adult males. *J Clin Endocrinol Metab* 2008; 93: 2350-7.
- Kawano S, Kawahara A, Nakai R, et al. *Helicobacter pylori* infection does not affect serum leptin concentration and body mass index. *J Gastroenterol* 2001; 36579-80.
- Blaser MJ, Atherton JC. *Helicobacter pylori* persistence: biology and disease. *J Clin Invest* 2004; 113321-33.